



### ବର୍ଷାଦିନେ ସବୁଜ ଘାସ ଚାଷ

ଡାଃ. ବୀର କିଶୋର ପରିଡ଼ା

ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ, ପଶୁ ପାଳନ ଓ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, କଟକ, ଓଡ଼ିଶା

ଆମ ରାଜ୍ୟ ଚମ୍ପାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିକା ହେଉଛି କୃଷି । କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବା ଉଚିତ । ଗାଈଙ୍କର କର୍ମରେ ଅନ୍ୟତମ ବିକାଶ ଅସମ୍ଭବ । ଉତ୍ତମ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ସୁରୁଧାର କରିବେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । କୃଷି ଓ କୃଷକ ଚାବନର ବିକାଶ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ । ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ଗୋ-ସମ୍ପଦ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ପ୍ରକୃତରେ କୃଷିକୃଷକ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ଗୋ-ସମ୍ପଦ ବିକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ, ସେ ଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସମୃଦ୍ଧ । ଏହି ଗୋ-ସମ୍ପଦକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ୨ ଗୋଟି ଭିନ୍ନ ପାଇଁ ପାଇଥାଉ । ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମ ଚାଷବାସପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବଳଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗୋମାତା ବା ରାଜ । ଶୁଣୁଛି ମା' କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତା'ର ଦାନ୍ତଦ୍ୟବଳା ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଳୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ । ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହି ଗୋମାତା ଦିନା ଦ୍ୱାର୍ଥରେ ତା'ର ପହୁଡ଼ୁ କ୍ଷୀର ଅହରହ ନିର୍ଗତ କରି କେବଳ ବସ୍ତୁତ୍ୱବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଗୋ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ କାମନା କରିବାହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସେହିପରି ବଳଦ ମଧ୍ୟ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟି କାମରେ ନିଯୋଜିତ ହୋଇ ଆମ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଗାଈଗୋରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଦୃଶକୋଟୀ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରାଣୀ । ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି ! 'ଡାଈଣ ସୁନ୍ଦର ଗୋରୁ' । ଗାଈଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି 'ଘାସ' । ଏହି ଘାସ ଖାଇ ହଳମ କରିବାପାଇଁ ୪ ଟାଣର ବା କୋଠରୀ ଦିଶିବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଳନକାରୀ ଯଥା-ରୁମେନ୍, ରେଟିକୁଲମ୍, ଓମାଲମ୍ ଓ ଆବୋମାଲମ୍ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗୋରୁ ଚକ୍ରକାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଘାସକୁ ହଳମ କରାଇବାପାଇଁ ଚକ୍ରକାତୀୟ ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ସହାୟକ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସବୁଜ ଘାସରେ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣର ଲିପିଡିନ୍-କ' ର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦନ ବିଟା-କାରୋଟିନ୍ ଓ ଧାତବଲବଣ ଯଥା-କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପଟ୍ଟ-ପତ୍ରସ୍, କୋସି, କପର, କୋବାଲ୍ଡ, ମ୍ୟାଗନେସିୟମ ଆଦି ନିହିତ ଥାଏ । ତେଣୁ ଦୁଧିଆକା ଗାଈ ଘାସ ଖାଇଲେ ଦେଖା କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଂଗ୍ରହରେ ଚର୍ମ ବିକଳତା ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ । ଗାଈମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗରମ ଆସି ଗରମତା ହୋଇଥାନ୍ତି । ଗାଈଙ୍କୁ ଘାସ ଖୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ । ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯିବା ସଂଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ ବଶେଷ ଲାଭଦାନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ମୋଟ ଚାଷ ଜମିର ହାରାହାରି ୪.୯% ଜମି ସବୁଜ ଘାସଚାଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି । ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳର ଯଥା-ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମିର ୯% ଜମିରେ ଘାସ ଚାଷ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି । ସବୁଜ ଘାସର ମାନବୃଦ୍ଧି ୨ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ । କ) ଦୃଶକାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାରଯୁକ୍ତ ଘାସ ଯଥା-ମକା, ବାଜରା, କୁଆର, ଏମ୍.ପି. ଚେରା, ମିଠାସୁଦାନ, ହାତିଆ ଘାସ, ଗିନି ଘାସ, ପାଉଁସ ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି । ଖ) ସୁଗନ୍ଧ ଚାଷୀୟ ପୃଷ୍ଠସାରଯୁକ୍ତ ଘାସ ଯଥା-କରସିମ୍, ଲୁସର୍ଣ୍ଣ, କରଗୁଡ଼ି, ଗୁଆର ଇତ୍ୟାଦି ।

ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଘାସ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ । ଋତୁ ବା ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ସବୁଜ ଘାସକୁ ୨ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା - କ) ଋତୁକାଳୀନ ଘାସ-ଯଥା-କରସିମ୍, କରଗୁଡ଼ି, ଲୁସର୍ଣ୍ଣ, ଗୁଆର, ମକା, ବାଜରା, ମିଠାସୁଦାନ ଇତ୍ୟାଦି । ଖ) ସବୁଦିନିଆ ଘାସ ଯଥା-ହାତିଆ ଘାସ (ଏସ୍.ବି.-୨୧, ସି.ଓ.-୧) ଗିନିଘାସ, ପାଉଁସ ଘାସ ।

ଖରାପ ଋତୁରେ ବର୍ଷିକ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିମ୍ନଶ୍ରେଣୀ ଘାସ ଚାଷ ସହଜରେ କରାଯାଇ ଅଧିକ ଘାସ ଅମଳ କରାଯାଇପାରିବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା-ହାତିଆ ଘାସ, ଗିନି ଘାସ, ପାଉଁସ ଘାସ, ମକା,

ବାଜରା, କୁଆର , ଦାନନାଥ, ଏମ୍.ପି. ଚେରା, ମିଠା ସୁଦାନ, କରଗୁଡ଼ି, ଗୁଆର ଇତ୍ୟାଦି ।

**ମୂଲିକା ଓ ଜଳବାୟୁ :** ଉଚ୍ଚା ନିମିତ୍ତା ବାଲିଆ ଗୋରା ଚମିରେ ହାତିଆ ଘାସ, ଗିନି ଘାସ, ମକା, ବାଜରା, କୁଆର ଘାସ ଚାଷ କରିବା ବିଧିଯୁକ୍ତ । ପାଣି କମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପାଉଁସ ଘାସ ଚାଷ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ । ବାଲିଆ, ଦୋରସା ମାଟିରେ କରଗୁଡ଼ି, କୁଆର, ଦାନନାଥ ପ୍ରଭୃତି ଘାସ ଚାଷ କଲେ ଲାଭ । ଉଷ୍ଣ ଓ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ସବୁଦିନିଆ ଓ କେତେକ ଋତୁକାଳୀନ ଘାସ ଚାଷପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ଜଳବାୟୁ ଓ ମାଟିର ଉତ୍ତମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଷା ଓ ଖରାଦିନେ ସବୁଦିନିଆ ଘାସ ଚାଷରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ମିଳେ ।

**ଜମି ପ୍ରକୃତି :** ହାତିଆ ଓ ଗିନି ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ୩/୪ ଓଡ଼ ଗଭୀର ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ତା'ପରେ ଜମିକୁ ମଲ ଦେଇ ସମତୁଳ କରାଯାଏ । ଏହି ଜମିରେ ମାଟି ସମତୁଳ ହେଲାପରେ ମହାଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ୩ ଫୁଟ ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୨ ୧/୨ ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗର୍ଭ ଖୋଳିବାକୁ ହୁଏ । ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଖତସାର ଦିଆଯାଏ । କିନ୍ତୁ ପାଉଁସ ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ଜମିକୁ, କେବଳ ବା ପୋଖରୀ କଣ୍ଠ, ସର ସରିଆ ବା ପାଣି କମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପୋତି ଦେଲେ ତାହା ଆପେଆପେ ମାଟିଯାଏ । ମକା, ବାଜରା, କୁଆର, ମିଠା ସୁଦାନ, ଏମ୍.ପି. ଚେରା, କରଗୁଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ କେବଳ ମାଟି ବା ଜମିକୁ ୩/୪ ଓଡ଼ ହଳ କରି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଚାଷ ସମୟରେ ମାଟିକୁ ସମତୁଳ ଅନାବନା ଘାସ ଚାଷି ବାହାର କରିବା ଦରକାର ।

**ଖତସାର :** ସବୁଦିନିଆ ଘାସ ଜମିରେ ୪-୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଖତସାର ଦରକାର କରିଥାଏ । ମହା ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଜମିରେ ଏକର ପିଛା ୧୦/୧୨ ଖଗଡ଼ ବା ୪ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୁଲି ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ । ଏଥି ସହିତ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦ କେ.ଜି. ସିଂଗ୍ଲ ସୁପର ଫସଫେଟ୍ ଓ ୧୫ କେ.ଜି. ପଟାସ ସାର ଦେବାକୁ ହୁଏ । ପ୍ରଥମ ଲଗାଇବାର ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତ ପ୍ରତିଥର ଘାସ ଅମଳ ନେଲାପରେ ଏକର ପିଛା ୫୦ କେ.ଜି. ଯୁଗିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ । ଗୁଆର ଆବର୍ତ୍ତନା ମିଶା ପାଣି ଓ ଗୋରୁ ମୁତ୍ର ପାଉଁସ ଘାସ ଦିଆଯାଉଥିବା ସେଲେ ଭଲ ଘାସ ହୁଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘାସ ଯଥା- ମକା, ବାଜରା, କୁଆର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ୫-୧୦ ଖଗଡ଼ ଗୋବର ଖତ ଦରକାର । ଚାଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବିଛାଇ ଜମିଚାଷ କରାଯାଏ । ମଞ୍ଜି ଦୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ୬୦ କେଜି ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଜମିରେ ପତ୍ତୋଗ କରନ୍ତୁ । ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ଆକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ୩ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ୬୦ କେଜି ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସାର ଜମିରେ ପକାନ୍ତୁ । କରଗୁଡ଼ି, ଗୁଆର ଦୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ୫ ଖଗଡ଼ ଗୋବରଖତ ଓ ୨୫ କେଜି ଆମୋନିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ସାର ଏକରପିଛା ଜମିରେ ପତ୍ତୋଗ କରନ୍ତୁ ।

**ବିହନ ଆବଶ୍ୟକତା :** ଏକର ପିଛା ହାତିଆ ଘାସ ପାଇଁ - ୫,୦୦୦ ମୂଳ ବା କାଢ଼, ଗିନିଘାସ - ୪,୦୦୦ ମୂଳ, ପାଉଁସ ଘାସ - ୧୦,୦୦୦ କାଢ଼ ଏବଂ ମକାପାଇଁ ମଞ୍ଜି - ୨୦କେଜି, ଏମ୍.ପି. ଚେରା ବା କୁଆର - ୧୨ରୁ୧୫ କେଜି, ବାଜରା - ୧୦ କେଜି, କରଗୁଡ଼ି - ୧୨ରୁ୧୬ କେଜି, ଗୁଆର ପାଇଁ - ୧୬ କେଜି ମଞ୍ଜି ଦରକାର ।

ବର୍ଷବ୍ୟାପୀ ଘାସର କାଢ଼ ବା ମୂଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଯାଏ । ମକା, ଏମ୍.ପି. ଚେରା, ବାଜରା, କରଗୁଡ଼ି ଓ ଗୁଆର ବିହନକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ି କରି ଦୁଣିବୁ । ନେପିଅର, ଗିନି ଓ ପାଉଁସ ଘାସର ପ୍ରତି ଖଣ୍ଡରେ ୨/୩ ଟି ଗଣ୍ଠିଥିବା ଦରକାର । ପ୍ରତି ମସାରେ ୨ ଖଣ୍ଡ କରି ଲଗାଇଲେ ଲାଭ । ତେଣୁ ଏକର ପିଛା ୧୦ ହକାର ମୂଳ ବା ଖଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ।

ଛଅ ରୁ ଆଠ ଲିଟର ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଥିବା ଗାଈକୁ ୨୫ ରୁ ୩୦ କେ.ଜି. କଞ୍ଚା ସବୁଜ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ ଦାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଦାନା ଦିଆ ଯାଉଥିବା ଗାଈକୁ ଦୈନିକ ୮ ରୁ ୧୦ କେ.ଜି. ସବୁଜ ଘାସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।

କଥାରେ ଅଛି,  
**“ଗାଈ ମୁହଁରେ ଦେଲେ ଘାସ  
 କ୍ଷୀର ବୁଝିବ ବାର ମାସ ।”**